Monsieur Cordes M.e chirurgien Commis aux rapports dans La ville de Cadillac sur garonne, agé de 30 ans, et d'un temperament sec et delicat fut affligé Le 15.e du mois de septembre dernier d'un bubon à la parotide gauche, qui dans Le principe se demontra dela grandeur d'un œuf de poule, fort dûr et resistant, sans etre accom=pagné de chaleur, de douleur ni de rougeur.

Cette tumeur accrût peu à peu, et dés que L'engorgement des grains glanduleux qui Concourent à former La parotide, fut assés Considerable, pour devoir occasionner une forte Compression sur Les vaisseaux sanguins qui sont repandûs, soit dans Le tissu dela glande meme, soit dans son Contour; Le malade Commença à ressentir une vive douleur dans La partie la plus interieure dela tumeur, qui Continua pendant 3. jours sans qu'il parut d'autre signe d'inflammation, qu'une rougeur dans une petite partie dela parotide, qui s'elevoit au milieu dela tumeur principale, en maniere d'un petit furoncle. à Cet etat succeda bientot, une veritable inflammation accompagnée detous Les signes qui La Caracterisent, et dont Le progrés fut si rapide et Les simptomes si violens, que dans moins de 24. heures La moitié dela face en fut prodigieusement tumefiée.

ARC 39 n° 190

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cette tumeur n'empechat pas dans son principe que le malade ne vaqpât aux fonctions de son ministere; il la crû meme de si peu de consequence, qu'il n'employoit d'autres secours que quelques cataplasmes emoliens dans l'intention de ramollir la matiere qui formoit l'engorgement, pour la rendre susceptible de quelque resolution, par l'application des emplâtres resolutifs qu'il s'étoit proposé de faire succeder aux cataplasmes emolliens.

Mais l'effet de ces topiques ne repondant pas à son attente, il prit le parti de se saigner, de se purger, et de faire succeder à ces secours generaux, l'usage de quelques bols aperitifs et purgatifs composés avec la poudre de cloportes, celle de vipere, de mercure doux et la rhubarbe, en continuant l'application des emplatres resolutifs.

Ce second traitement n'opera pas un effet plus salutaire que le premier. la parotide augmenta de plus en plus, le malade commença à sentir la vive douleur dont il a deja été fait mention, ce qui l'obligea à se faire deux saignées precipitées, sçavoir une du bras et l'autre du pied, et à appliquer sur la tumeur des cataplasmes emolliens, anodins et resolutifs, tels qu'on fait ordinairement avec les farines resolutives, la morelle, la jusquiame &c.

Enfin l'inflammation succedant de fort prés à cette vive douleur, malgré tous ces topiques, et la tumeur perseverant toujours dans le meme degré de dureté; le malade reconnut bientot l'impossibilité qu'il y avoit à obtenir la resolution de cette tumeur.

il ne pensa plus qu'à favoriser la suppuration qu'il présumoit deja commencée, par l'application des cata=
=plasmes maturatifs, qui effectivement opérèrent cet ouvrage dans 36. heures, au point que la tumeur laissa appercevoir un sentiment de fluctuation vers la partie moyenne et anterieure du masseter.

L'empressement que témoigna le malade à se procurer quelque soulagement (par l'ouverture prompte de l'abscès formé) fit qu'on mit en usage la voye de necessité. on fit incontinent et le 5.e octobre une ouverture longitu=
=dinale, de près d'un deux travers de doigts dans la partie designée, ne pouvant pas absolument la pratiquer plus bas, attendu la grande dureté de la tumeur. il en sortit environ un verre et demi d'un pus extremement puant et ichoreux: on conduisit cet ulcere selon toutes les regles de l'art, sçavoir par des digestifs melés de suppuratifs, les injections detersives, des mondificatifs, et les emplâtres resolutifs qu'on appliquoit par dessus; la suppuration fournit abondamment pendant 8. jours. le pus qui decouloit de tous cotés des parties les plus eloignées de la tumeur etoit fort blanc et d'une nature louable.

La regeneration des chairs se fit meme assés promptement tant dans les fonds que dans les cotés pour devoir se flatter d'obtenir bientot la reunion et la cicatrice des bords de la playe.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

mais une humeur sereuse et mucilagineuse qui en imposa pendant quelques jours sous l'apparence d'une limphe onctueuse et nourricière, en entretint pendant quelques jours l'ouverture, de façon que les bords de la playe se racornirent au point qu'on fut obligé d'y appliquer la pierre infernale, et d'injecter de l'eau phagédenique pour tacher de tarir la source qui entretenoit l'ouverture de l'abscés.

tous ces secours ont été inutils. La serosité a fourni de plus en plus, et surtout lors de la mastication : elle en decoule actuellement fort claire et fort limpide, mais ce n'est que lorsque le malade prend son repas. il s'est formé une cicatrice à la faveur d'une pellicule qui unit les deux bords ; mais il reste un petit trou ou la tete d'un epingle auroit peine de passer, qui donne issüe à cette humeur, et on observe à coté du bord anterieur de la cicatrice une dureté sans tumeur, de la grandeur d'un liard, qui s'etendant à l'endroit ou le conduit de stenon perce le buccinateur pour porter la salive dans la bouche. Le malade ressent un engourgissement dans toute la partie anterieure moyenne de la bouche, et il ne peut ouvrir la bouche avec la meme aisance qu'auparavant